

Houd deze kaart altijd bij u en toon deze kaart aan iedere arts die u raadpleegt voor een medische behandeling.

Infecties

Certolizumab pegol (CZP) verhoogt het risico op infecties. Infecties kunnen sneller evolueren en ernstiger zijn. Dit is onder meer het geval bij tuberculose (TB).

Voorafgaand aan behandeling met CZP:

- U mag niet met CZP worden behandeld als u een ernstige infectie heeft.
- U moet gescreend worden op hepatitis B infectie. Indien u drager bent van het hepatitis B virus zal u zeer nauw opgevolgd worden voor de tekenen en symptomen van een actieve hepatitis B infectie. CZP moet gestopt worden bij patiënten die een actieve hepatitis B infectie ontwikkelen
- U moet worden getest op TB. Het is zeer belangrijk dat u uw arts vertelt indien u ooit TB heeft gehad of indien u in nauw contact bent geweest met iemand die TB heeft gehad.

Noteer hieronder de data van uw laatste testen op TB:

Mantouxtest/tuberculine test/IGRA: _____

Rx thorax: _____

Goed om te weten tijdens uw behandeling met CZP:

- ⚠ Indien u symptomen ontwikkelt die wijzen op een infectie, zoals koorts, aanhoudend hoesten, gewichtsverlies of lusteloosheid, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Patiënten die gevaccineerd dienen te worden

- Levende of van geïnactiveerde levende vaccins dienen niet toegediend te worden tijdens de behandeling met CZP.

Hartfalen

Vóór start van behandeling met CZP:

- Artsen moeten achtzaam zijn bij patiënten met hartfalen. U mag CZP niet gebruiken als u aan matig tot ernstig hartfalen lijdt.

Tijdens behandeling met CZP:

- ⚠ Indien u symptomen heeft die wijzen op het ontwikkelen van hartfalen (bijvoorbeeld kortademigheid of gezwollen voeten), raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Allergische reacties

- ⚠ Als u symptomen van een allergie vertoont, zoals ernstige huiduitslag, netelroos, ademhalingsproblemen of problemen met slikken, stop met CZP en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Sommige van deze reacties kunnen optreden, na de eerste toediening van CZP.

Maligniteiten (kanker)

Tijdens behandeling met CZP:

- ⚠ Bij patiënten met ernstige, chronische ontstekingsziekten zoals reumatoïde artritis (RA) bestaat een verhoogd risico op kanker. Het gebruik van anti-TNF kan het risico op kanker ook verhogen. In studies over RA werden maligniteiten echter bij een vergelijkbaar aantal met CZP behandelde patiënten gerapporteerd, vergeleken met de controlegroep die niet met CZP behandeld werd.

RMMC00043.01 / juni 2019

Deze patiëntenherinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voordat CERTOLIZUMAB PEGOL aan u wordt toegediend.

Aanvullende informatie betreffende certolizumab pegol is beschikbaar in de samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl

Datum van samenstelling:
juni 2019

Verstoring van bloedstollingstesten

Patiënten moeten hun arts informeren indien zij behandeld worden met anti-coagulantia (bloedverdunners) en indien er een stollingstest wordt uitgevoerd. Bepaalde bloedstollingstesten kunnen verstoord zijn bij patiënten behandeld met CZP. CZP kan deze testen beïnvloeden zodat er een foutieve verlengde stollingstijd wordt weergegeven terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Dit is waargenomen met de PTT-LA-test en de STA-PTT-LA-testen van Diagnostica Stago, en met de HemosIL APTT-SP liquid en de HemosIL APTT lyophilized silica-testen van Instrumentation Laboratories. Ook andere aPTT-testen kunnen worden verstoord. Verstoring van de trombinetijdbepaling (TT-test) en protrombinetijdbepaling (PTT-test) is niet waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat behandeling met CZP effect heeft op de bloedstolling (in-vivo-stolling).

Patiënten die een operatie moeten ondergaan

Indien u een operatie moet ondergaan terwijl u met CZP wordt behandeld, dient u te worden gecontroleerd op infecties die, indien zij zich voordoen, adequaat moeten worden behandeld. Elke voorschrijver die een medische behandeling opstart bij deze patiënt dient de samenvatting product kenmerken van CZP te raadplegen.

Data van behandeling met CZP

1e injectie: _____


Volgende injecties: _____

- Zie de bijsluiter voor meer informatie.
- Zorg dat u bij elk bezoek aan een zorgverlener een lijst met alle andere geneesmiddelen die u gebruikt bij u heeft.

Naam van de patiënt: _____

Naam en telefoonnummer van uw huisarts: _____

Naam en telefoonnummer van uw specialist: _____

 Houd deze kaart bij tot 5 maanden na de laatste CZP-injectie aangezien sommige bijwerkingen lange tijd na uw laatste dosis CZP kunnen optreden.

HERINNERINGSKAART BETREFFENDE CERTOLIZUMAB PEGOL VOOR PATIËNTEN

Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen en zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).